

Editörden

Karaciğer kanseri, dünyada kansere bağlı ölümlerin dördüncü sırasında yer almaktadır. Bu kanser primer veya sekonder olarak gelişmektedir. Primer karaciğer kanserlerinin % 80'ini hepatosellüler kanser oluşturmaktadır.

Hepatosellüler karsinoma, en çok Afrika ve Güneydoğu Asya'da görülmekte, buralarda çok yaygın olan Hepatit B ve Hepatit C'nin daha sonraları siroz ve karaciğer kanserine dönüşmesiyle oluşmaktadır.

Primer kanserin etiyolojisinde viral hastalıklar (Hepatit B ve C) rol oynamaktadır. Son yıllarda, karaciğerde demir yüklenmesiyle oluşan hemakromatozis'in de bir başka etiyolojik faktör olduğu belirtilmiştir. Bağırsaktan emilen demirin karaciğerde birikmesiyle oluşan ve genetik bir hastalık olan hemokromatozis, flebotomi ile önlenmez ise siroz ve hepatosellüler kansere neden olabilir. Bu önemli hastalığı inceleyen bu makaleye derginin bu sayısında yer verildi. İlgi ile okunacağını sanıyorum.

From The Editor

Hepatic cancer is the fourth leading cause of cancer-related deaths in the world. This cancer develops primary or secondary. Hepatocellular cancer constitutes 80% of primary hepatic cancers.

Hepatocellular carcinoma is most common in Africa and Southeast Asia, and it occurs when Hepatitis B and Hepatitis C, which are very common there, later turn into cirrhosis and hepatic cancer.

Viral diseases (Hepatitis B and C) play a role in the etiology of primary cancer. In recent years, it has been stated that hemachromatosis, which occurs due to iron overload in the liver, is another etiological factor. Hemochromatosis, a genetic disease that occurs when iron absorbed from the intestine accumulates in the liver, can cause cirrhosis and hepatocellular cancer if it is not prevented by phlebotomy. This article examining this important disease is included in this issue. I think it will be read with interest.

Prof. Dr. H. Aysel ALTAN